



Baclofeno en el tratamiento de la dependencia al alcohol: ¿una nueva esperanza fallida?

Baclofen in treatment of alcohol dependence: a new disappointed hope?

Eduardo López-Briz*, José Olcina Rodríguez**

*Servicio de Farmacia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia, España). CASP España.

**Unidad de Alcohología. Departamento de Salud de Gandía. Gandía (Valencia, España).

Recibido: 28/11/2018 · Aceptado: 03/12/2018

Referencia

Rose, A.K.; Jones, A. (2018). Baclofen: its effectiveness in reducing harmful drinking, craving, and negative mood. A meta-analysis. *Addiction*, 113(8):1396-1406. <https://doi.org/10.1111/add.14191>

Resumen

Desde hace algunos años, el baclofeno, un agonista de los receptores B del gamma-aminobutirato (GABA) clásicamente utilizado en el tratamiento de la espasticidad, viene apareciendo con cierta frecuencia en medios especializados como una alternativa en el tratamiento de los trastornos relacionados con el uso de alcohol (TRUA). Con objeto de analizar y sintetizar la evidencia clínica disponible, Rose & Jones llevaron a cabo una revisión sistemática (RS) con meta-análisis que se comenta a continuación.

— Correspondencia a: _____
Eduardo López-Briz
e-mail: lopez_edubri@gva.es