

Estudio comparativo de tres grupos de alcohólicos

A. V. MATEO PEREZ

Médico Especialista de 1^{er}. Grado en Psiquiatría. Santo Domingo, República Dominicana.

E. GUMA DIAZ

Doctor en Ciencias Biológicas. Profesor Titular. Médico Especialista de 2.º Grado en Fisiología Normal y Patológica, Neurofisiólogo del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba.

R. GONZALEZ MENENDEZ

Profesor Auxilia. Médico Especialista de 2.º Grado en Psiquiatría. Jefe del Servicio "Rogelio Paredes" del Hospital Psiquiátrico de La Habana, Cuba.

RESUMEN

A 21 alcohólicos primarios hospitalizados, 53 alcohólicos primarios ambulatorios y 48 alcohólicos secundarios ambulatorios les fue aplicada una historia clínica estructurada así como el cuestionario MAST (Michigan Alcoholism Screening Test), comparándose los resultados obtenidos en los tres grupos de pacientes mediante pruebas estadísticas no paramétricas. Se confirmó la mayor gravedad de los pacientes hospitalizados, caracterizada por mayor consumo abusivo resultante en un mayor grado de deterioro, alcanzado con mayor rapidez a pesar de ser portadores de menor carga hereditaria alcohólica.

Palabras Clave: Alcoholismo. MAST

SUMMARY

A structured interview and the Michigan Alcoholism Screening Test were administered to 21 primary alcoholic inpatients, 53 primary alcoholic outpatients and 48 secondary alcoholic outpatients. Results from the three groups of alcoholic patients were statistically compared by non-parametric tests. Greater severity of the alcoholism in the inpatients was shown by higher abusive consume leading to deeper and faster deterioration in spite of lesser alcoholic inheritance.

Key Words: Alcoholism. MAST.

RÉSUMÉ

On a appliqué une histoire clinique structurée et le questionnaire MAST (Michigan Alcoholism Screening Test) à 21 alcooliques primaires hospitalisés, 53 alcooliques primaires en traitement ambulatoire, et 48 alcooliques secondaires également en traitement ambulatoire; les résultats obtenus des trois groupes ont été comparés avec des statistiques non paramétriques. Le plus haut niveau de gravité a été confirmé chez les malades hospitalisés, de consommation plus élevée, impliquant une détérioration plus importante, quoique ces malades aient eu une charge héréditaire alcoolique moindre.

Mots Clé: Alcoolisme. MAST.

CORRESPONDENCIA A:

E. Gumá Díaz

Hospital Psiquiátrico de La Habana

Avenida Independencia 26520, Mazorra, Municipio

Boyeros, Ciudad de La Habana

CP 19220, Cuba