

COMUNICACIONES BREVES

Muertes por reacción adversa a drogas de abuso

Fernando Rodés*, Juan Bautista Martí**, M^a Angeles Vázquez***

(*) Profesor Asociado de Medicina Legal y Toxicología

(**) Catedrático de Medicina Legal

(***). Toxicología, Licenciada en Derecho

División de Toxicología-Legislación Sanitaria
Facultad de Medicina. Universidad de Alicante. (España)

Resumen: Las muertes por reacción adversa a drogas de abuso son un importante y trascendente fenómeno social, que tuvo su inicio en nuestro país a principio de la década de los ochenta y desde entonces ha sufrido un incremento progresivo hasta nuestros días.

Presentamos una revisión de los fallecimientos debidos a esta causa ocurridos en el Partido Judicial de Elche (Alicante, España) desde 1980 hasta 1993, analizando los siguientes parámetros a través de su frecuencia de distribución: año, mes, sexo, estado civil, edad, actividad laboral, antecedentes de toxicomanía, antecedentes penales, lugar del fallecimiento y vía de administración de la droga.

Se comparan los resultados obtenidos con otros estudios similares realizados en España.

Obtenemos el siguiente prototipo del sujeto estudiado: varón, de 26 años, soltero, sin trabajo, con antecedentes de toxicomanía, sin antecedentes penales, que fallece en el hospital y que utiliza la vía intravenosa.

Palabras clave: Muerte por efecto adverso de droga. Sobredosis. Toxicomanía.

Summary: Deaths caused by an adverse reaction to drug abuse are an important and significant social phenomenon which began in Spain at the beginning of the eighties and since then has increased progressively to the present day.

CORRESPONDENCIA:

Fernando Rodés Lloret
División de Toxicología-Legislación Sanitaria
Campus de San Juan
Apartado Correos 374
03080 ALICANTE (España)
Teléfono (96) 5659811

Muertes por reacción adversa a drogas de abuso

We present a review of deaths due to this cause which have occurred between 1980 and 1993 within the district of Elche (Alicante, Spain). The following parameters are analyzed by means of their frequency of distribution: year, month, sex, marital status, age, occupation, record of drug addiction, criminal record, place of death and method of administering drugs. The results obtained are compared with those of other similar studies carried out in Spain.

The following prototype of the subject studied is obtained: male, 26 years old, single, unemployed, with a previous record of drug addiction, without criminal record, dies in hospital and use of intravenous method of administering drugs.

Key Words: *Death from the adverse effects of drugs. Overdose. Drug addiction.*

Résumé: *Les décès par réaction adverse dûe à l'abus de drogues représentent un phénomène social important et même transcendant en Espagne; il a commencé au début des années quatre-vingts et depuis s'est développé progressivement.*

Une révision de décès dans la région de Elche (Alicante, Espagne) a été faite de 1980 à 1993, ainsi qu'une analyse des paramètres suivants: année, mois, sexe, état civil, âge, activité laborale, antécédents de toxicomanie, antécédents pénaux, lieu de décès, et étude des voies d'administration de la drogue. Les résultats obtenus sont comparés avec d'autres études similaires réalisés en Espagne.

Finalmente, nous avons obtenu le prototype du sujet que nous avons étudié: homme, 26 ans, célibataire, sans travail, avec antécédents de toxicomanie, sans antécédents pénaux, décédé à l'hôpital, et qui utilise la voie intraveineuse pour l'administration de la drogue.

Motes Clé: *Décès causés par l'action adverse de la drogue. Surdose. Toxicomanie.*

Introducción

El consumo de drogas de abuso es hoy en día uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad. Este consumo, en ocasiones, da lugar a una reacción aguda adversa, con el resultado del fallecimiento del drogodependiente.

Algunas cifras corroboran esta importancia: según el Informe del Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT) correspondiente a 1992 (SEIT, 1993), en ese año, se notificaron en España: 21.678 episodios de urgencias hospitalarias originadas por el consumo de opiáceos y cocaína; 38.831 casos de inicio de tratamiento

ambulatorio por consumo de opiáceos o cocaína; y 780 casos de muerte por reacción aguda tras el consumo de opiáceos o cocaína.

El consumo de drogas de abuso en España ha seguido una evolución similar a la de otros países, aunque con un considerable retraso: si bien en los años setenta era el haschis el protagonista, en los ochenta lo es la heroína, y en la década actual aunque lo sigue siendo, se detecta un importante incremento en el consumo de cocaína y de las llamadas drogas de diseño.

Por otro lado, también la mortalidad aguda debida a las drogas de abuso surgió en España cuando ya en otros países era un