

COMUNICACIONES BREVES

Mortalidad debida al alcohol en España

Milagros Bernal Pérez; Francisco J. Gómez Bernal; Germán Gómez Bernal
Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza (España)

Resumen: *La mortalidad por causa del alcohol se pone de manifiesto a través de numerosas enfermedades, por lo que es difícil realizar un cálculo exacto de ella. En este trabajo se ha estudiado la mortalidad debida al alcohol recogida en los items 23 y 24 de la CIE-9 denominados psicosis alcohólica y síndrome de dependencia al alcohol.*

El estudio, que recoge los datos de tres años (1990, 1991 y 1992) se ha realizado en todas las comunidades autónomas españolas, estudiando las tasas de mortalidad ajustadas por edad y sexo, y los años potenciales de vida perdidos (APVP) debidos al alcohol. Se ha visto que, en general, tanto las tasas de mortalidad como los APVP están más elevados en los hombres que en las mujeres. Las comunidades autónomas que presentan las mayores tasas han sido Canarias, Galicia y La Rioja, y las de mayor APVP, Navarra y Galicia.

Palabras clave: *Alcoholismo. APVP. Mortalidad.*

Summary: *Death caused by alcohol may stem from numerous illnesses it difficult to calculate exactly. Death through alcohol is the subject of points 23 and 24 of the CIE-9 titled Alcoholic Psychosis and Alcohol Dependency Syndrome.*

The survey was carried out in all the autonomous communities and the death rate per age group and sex was analyzed as well as the years of life which may be lost due to alcohol (YLPL). It has been found that, in general, both death and YLPL are more common in men than in women. The communities which show the highest rates are Canary Isles, Galicia and La Rioja, and per YLPL are Navarre and Galicia.

Key words: *Alcoholism. YLPL. Mortality.*

CORRESPONDENCIA A:

Milagros Bernal Pérez
Avenida de la Ilustración, 24 casa 69
50012 Zaragoza (España)

Résumé: La mortalité par l'alcool se manifeste par de nombreuses maladies, ce qui rend les calculs difficiles. Dans cette étude on a analysé la mortalité due à l'alcool recueillie dans les items 23 et 24 de la CIE-9 appelés Psychose Alcoolique et Syndrome de Dépendance à l'Alcool.

L'étude qui dure un espace de trois ans (1990, 1991 et 1992) s'est réalisée dans toutes les régions autonomes espagnoles, en étudiant les taux de mortalité en rapport avec l'âge, le sexe, et les années de vie perdues (APVP) par l'alcool. On peut voir que, en général, autant les taux de mortalité comme les APVP sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes. Les régions autonomes qui présentent les taux les plus élevés ont été: Les Canaries, La Galicie et La Rioja; et les taux plus élevés en rapport avec l'APVP ont été: La Navarre et La Galicie.

Mots clé: Alcoolisme. APVP. Mortalité.

1. Introducción

España constituye uno de los países del mundo de mayor consumo de alcohol estableciéndose, en función de la renta *per capita* y litros de consumo, la tercera de Europa después de Francia y Luxemburgo.

El alcoholismo está implicado en muchas de las causas de mortalidad como factor de riesgo, por lo que existe cierta dificultad en cuantificar la muertes debidas a esta causa (Klasky, 1993; Coombs-Orme, 1983). Apesar de estas dificultades, en este trabajo se ha querido valorar en cada una de las comunidades autónomas de España, cuáles son las tasas de mortalidad por psicosis alcohólicas y síndrome de dependencia al alcohol, en las que existe una relación directa causa-efecto.

Igualmente, se ha querido conocer cuál es la tasa de años de vida potencialmente perdidos (APVP) por estas causas y, por último, comentar la comparación de las tasas de mortalidad de cada una de las comunidades autónomas con las tasas de suicidios que se han descrito en dichas comunidades por algunos autores.

2. Material y métodos

Se ha utilizado como material de estudio los casos de muerte ocurridos durante los años 1990, 1991 y 1992 por psicosis alcohólica y síndrome de dependencia al alcohol, codificados con los items 53 y 54, respectivamente, en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), por considerar que son las más representativas del consumo y muerte por alcohol. Estos datos han sido recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su publicación anual *Defunciones por causa*.

Como poblaciones, se han considerado las correspondientes al año estudiado para cada comunidad autónoma cuya estimación figura en el INE en su publicación *Proyección de la Población Española hasta el año 2000*. Se ha aplicado el método epidemiológico descriptivo, utilizando como indicador las tasas de mortalidad por causa (Rothman, 1987). Se han estimado las tasas de mortalidad por 100.000 habitantes en cada comunidad autónoma.

Mediante un ajuste de tasas directos (San Martín, 1980) se ha calculado las tasas