

Originals

Pautas de antagonización rápida ambulatoria en dependientes de opiáceos. Análisis comparativo.

Carreño Rendueles, J. E.^{*1}; Bobes García, J.^{**1};
Sánchez del Río, J.^{***1}; Alvarez, C.E.^{*1}; San Narciso, G.I.^{*1};
Pérez, S.F.^{*2}; García, M.^{***3}

* Clínica Médico Psicológica Asturias. Gijón. Asturias. España.

** Área de Psiquiatría. Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo. Asturias.

*** Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. Hospital Central de Asturias. Oviedo. Asturias. España.

¹ Médicos. ² Psicólogo. ³ DUE.

Resumen

Han sido estudiados 171 pacientes ambulatorios dependientes de opiáceos, que han realizado desintoxicación (pautas de antagonización) rápida con naltrexona. Ha sido evaluada la eficacia de estas pautas frente a pautas clásicas. El 100% de los pacientes que realizaron estas pautas de antagonización rápida ambulatoria ha alcanzado la desintoxicación, frente al 73-80% de los pacientes que realizaron pautas clásicas. Ha sido realizado un seguimiento posterior a la desintoxicación, durante seis meses, evaluándose el inicio de tratamiento de deshabituación posterior, un 73% en los pacientes que realizaron pautas de antagonización rápida, frente a un 55% en los pacientes que realizaron desintoxicación clásica. También se ha evaluado el índice de retención al tratamiento de deshabituación, no encontrándose diferencia significativa. Se ha demostrado la idoneidad e interés de este método para comenzar programas integrales de tratamiento.

Palabras Clave

Naltrexona; desintoxicación de Opiáceos; ultracorta; ambulatoria; evaluación.

Correspondencia a:

José Eduardo Carreño Rendueles • Clínica Médico Psicológica • Cl. Asturias - Asturias 8, 5º. 33206 Gijón. (España)
Tel. 98 534 16 07 - E-mail: cmedico@omc.telprof.es



Summary

171 ambulatory opiate dependents have been studied, they have done a rapid detoxification (antagonisation procedures) with naltrexone. The effectiveness of this procedure has been evaluated. We found out that 100% of the patients who followed this outpatient rapid antagonisation procedure achieved detoxification, versus 73-80% of the patients who followed classical procedures. Followed for 6 months to evaluate the beginning of the ulterior treatment, 73% of patients made a rapid antagonisation procedure versus 55% of patients who made a classical detoxification. We also have assessed the retention of the desintoxication rate, without significative differences. The ability and interest of this method to start up programs with complete treatments has been demonstrated.

Key Words

naltrexone, ultra-short opiate detoxification, out-patients, assessment.

Résumé

On a étudié 171 malades ambulatoires dépendants d'opiacés, qui ont réalisé désintoxication (programme d'antagonisation) rapide avec la naltrexone. L'efficacité des ces normes a été évaluée face à l'efficacité des règles classiques. Le cent pour cent (100%) des malades qui ont réalisé le programme d'antagonisation rapide ambulatoire a fait la désintoxication, face au 73-80% pour cent des malades qui ont suivi les règles classiques. Après la désintoxication on a réalisé un suivi de six mois en évaluant le début du traitement de déshabituuation postérieure, un 73% des malades qui l'ont réalisé face à un 55% des malades qui ont fait une désintoxication classique. On a évalué aussi l'index de retenue dans le traitement de déshabituuation et nous n'avons pas trouvé de différences significatives. On a montré l'idonéité et l'intérêt de cette méthode pour commencer des programmes complets de traitement.

Mots clé

naltrexone, désintoxication ultracourte d'opiacés, ambulatoire, évaluation.