

Estimación de la calidad de vida en toxicomanías mediante el cuestionario MOS-SF-35: estructura factorial, consistencia interna y validez.

Iraurgi Castillo, I.

Psicólogo. Módulo de Asistencia Psicosocial de Rekalde. Asociación de Profesionales de Centros de Atención a Drogodependencias del País Vasco (APCAD).

Resumen

En el presente trabajo se estudian las propiedades psicométricas de la escala de calidad de vida relacionada con la salud, siguiendo dos versiones del *Medical Outcomes Study* (MOS). La muestra ($n=40$) está formada por todos los usuarios del Programa de metadona del Módulo de Asistencia Psicosocial de Rekalde. La estructura factorial fue sometida a un análisis de componentes principales. Los resultados obtenidos muestran que la versión del cuestionario utilizado en este estudio reproduce en buena medida la estructura propuesta por los autores para sujetos con VIH/SIDA (Wu et al., 1991). Los índices de consistencia interna de las subescalas muestran valores moderados-altos (entre 0,66 y 0,87), siendo el de la escala total de 0,89. Para estudiar la validez de constructo de los componentes de la escala se calcularon las correlaciones entre éstos y otros constructos afines (estrés, ansiedad, depresión, sintomatología, problemas psicosociales). Los resultados obtenidos aportan correlaciones significativas entre la escala de calidad de vida y sus diferentes componentes con los constructos observados, mostrando una validez satisfactoria de la escala para su utilización en población toxicomana.

Palabras Clave

Calidad de vida; cuestionario MOS-SF-35; fiabilidad; validez de constructo; toxicomanías; metadona.

Summary

In this study, the psychometric properties of a 35-items version of the Medical Outcome Study (MOS) are analyzed in a sample of 40 patients of a methadone programme from the Psychosocial Attendance Module in Rekalde. The factorial structure was studied

– Correspondencia a: Ioseba Iraurgi · Módulo de Asistencia Psicosocial de Rekalde · C/ Camilo Villabaso 24-Ionja 48002-Bilbao (España) · Tels. 944 449 859 - 860 · Fax: 944 101 081.



using principal components analysis. The results showed that the questionnaire used for this study reproduces the major structure suggested by Wu et al. (1991) among HIV patients. The subscales' internal consistency coefficients (between 0,66 and 0,87) showed moderate-high rates, and total consistency 0,89. To test the construct validity of the subscales, correlations between them and other similar construct (stress, anxiety, depression, symptomatology, psychosocial troubles) have been computed. The results showed significant correlations between the scale of quality of life and the different components of observed construct, demonstrating a satisfactory effect on the scale to use it among drug addicts.

Key Words

Quality of life; MOS-SF-35 questionnaire; reliability; construct validity; drug addiction; methadone.

Résumé

On étudie les propriétés psychométriques d'une échelle de qualité de vie, selon les deux versions du Medical Outcomes Study (MOS). L'échantillon ($n=40$) est composé par les malades admis au programme de substitution d'opiacés (méthadone) au Centre d'Assistance Psychocial à Rekalde. On a soumis le questionnaire à une analyse factorielle de composants principaux. Les résultats montrent que notre version du questionnaire reproduit en général la structure des dimensions proposées par les auteurs pour les patients avec VIH/SIDA (Wu et al., 1991). Les index de consistance interne des sous-échelles ont des valeurs modérées-élévées (entre 0,66 et 0,87) et le coefficient de consistance interne de l'échelle générale est de 0,87. Pour contraster la validité théorique (construct validity) des composants de l'échelle on a calculé les corrélations existantes entre ceux-ci et les variables associées (stress, anxiété, dépression, symptomatologie physique et problèmes psychosociaux). Les résultats montrent des corrélations significatives entre l'échelle de qualité de vie et ses sous-échelles avec les variables mesurées, démontrant une validité satisfaisante de cette échelle pour être appliquée chez les toxicomanes.

Mots clé

Qualité de vie; questionnaire MOS-SF-35; fiabilité; validité théorique; toxicomanies; méthadone.